

## **Albicar®**

Albendazol tabletas de 400 mg  
Albendazol suspensión 400 mg/10 ml

### **COMPOSICIÓN:**

- Albicar 200 mg tabletas: cada tableta contiene: albendazol 200 mg, lactosa 393 mg, sacarina sódica 1 mg, excipientes c.s.
- Albicar 400 mg / 10 mL suspensión: cada 10 mL contienen: albendazol 400 mg, sacarina sódica 0,50 mg, sorbitol (70%) 1.000 mg, vehículo c.s.

### **INDICACIONES:**

Parasitosis intestinal simple y múltiple. Tricocefalosis, ancylostomiasis, necatoriasis, estrogiloidiasis, teniasis e himenolepiasis. Suspensión oral: tratamiento de la giardiasis en niños de 2 a 11 años.

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

### **POSOLOGÍA:**

- Albicar 200 mg tabletas: adultos 400 mg en dosis única. En caso de estrogiloidiasis, himenolepiasis y teniasis: 400 mg / día por 3 días. Niños mayores de 4 años: 400 mg dosis única.
- Albicar 400 mg / 10 mL suspensión: parasitosis corrientes: adultos y niños mayores de 2 años: 400 mg en dosis única. En caso de estrogiloidiasis, himenolepiasis y teniasis: 400 mg / día por 3 días. Giardiasis: niños de 2 a 11 años: 400 mg / día en una sola toma por 5 días.

### **REACCIONES ADVERSAS:**

Hematológicas: leucopenia. Hepáticas: alteraciones de las transaminasas. Gastrointestinales: diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, migración de áscaris por vía oral y nasal. Dermatológicas: rash, urticaria y edema angioneurótico en pacientes hipersensibles. Otras: alopecia.

### **ADVERTENCIAS:**

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No debe ser administrado durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo / beneficio sea favorable. De ser imprescindible su uso, suspenda la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto no debe ser administrado en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

**PRECAUCIONES:**

En pacientes con cirrosis hepática y/o alteraciones hematológicas.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Tabletas: niños menores de 4 años.  
Suspensión: niños menores de 2 años.

**INTERACCIONES:**

Dexametasona, cimetidina, teofilina, praziquantel, aminoglucósidos, diuréticos.

**Registrado en el M.P.P.S. bajo el N°**

- Albicar 200 mg tabletas E.F. 27.447/16.
- Albicar 400 mg /10 mL suspensión E.F. 28.826/16.

Venta con prescripción facultativa.

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S.A. Rif: J-00219195-3

Oficinas: La Castellana – Caracas.

Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela.

Pharmacode: 16