

Alres® granulado para solución oral

Descripción: Alres® granulado para solución oral. E.F. 37.511 / 08.

Composición: cada sobre de 3 g contiene: acetaminofén 500,00 mg, dextroclorfeniramina maleato 2,00 mg, cafeína 30,00 mg, sucralosa 30,00 mg, lactosa 1.743,20 mg, excipientes c.s.

Indicaciones: tratamiento sintomático del resfriado común y/o gripe.

Vía de administración: oral.

Posología (dosis recomendada): adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre diluido en una taza de agua caliente o fría cada 6-8 horas.

Reacciones adversas: somnolencia, urticaria, rash, sequedad de la boca, vértigo, náuseas, vómito, epigastralgias, anemia, ictericia, daño hepático o renal.

Advertencias: si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Este producto produce un alivio temporal de los síntomas, si no obtiene mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. La administración por tiempo prolongado puede ocasionar graves lesiones hepáticas o renales. No exceder la dosis recomendada ni administrar por períodos mayores de 10 días. El paciente debe informar al médico de cualquier efecto indeseable.

Precauciones: este producto puede causar somnolencia, por lo cual debe ser utilizado con cautela en personas que manejen vehículos y maquinarias. No ingerir bebidas alcohólicas ni sedantes. Este producto no debe ser administrado en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Pacientes con enfermedad hepática, estenosis pilórica, retención urinaria, asma, glaucoma. Durante el tratamiento no se deben ingerir bebidas alcohólicas, ni medicamentos sedantes o de acción central.

Interacciones: barbitúricos y otros depresores del Sistema Nervioso Central, inhibidores de la MAO, cloranfenicol, metoclopramida, anticoagulantes orales, alcohol.

Presentación: estuche con 10 sobres. E.F. 37.511 / 08.

Venta sin prescripción facultativa.