

Brane® 600 mg comprimidos recubiertos

Descripción: Brane® 600 mg comprimidos recubiertos. E.F. 35.682.

Composición: cada comprimido recubierto contiene: ibuprofeno 600 mg, lactosa 54,65 mg excipientes c.s.

Indicaciones: tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada.

Vía de administración: oral.

Posología: 800 – 3.200 mg/día. Dosis máxima 3.200 mg/día.

Reacciones adversas: gastrointestinales: dispepsia, náuseas, vómito, anorexia, diarrea, constipación, flatulencia, dolor epigástrico, abdominal, úlcera péptica, sangramiento abdominal. S.N.C.: mareos, dolor de cabeza, fatiga, malestar, ansiedad. Óticas y oculares: tinnitus, disminución de la audición. Hepáticos: ictericia y hepatitis severa. Dermatológicas: urticaria, eritema, prurito, síndrome de Stevens-Johnson, acné. Hematológicas: neutropenia, agranulocitosis, anemia, aplásica, hemolítica, trombocitopenia. Renales: insuficiencia renal aguda, poliúrea, azotemia, cistitis, hematuria. Otros: edema, retención de fluidos hipertensión, reacciones de hipersensibilidad.

Advertencias: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia mientras dure el tratamiento. No debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

Precauciones: pacientes con: insuficiencia hepática y/o renal crónica, antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, asma bronquial, hipertensión arterial, trastornos auditivos y visuales.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aspirina y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, hemorragia gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, alteraciones de la coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes. Dengue.

Interacciones: digoxina, fenitoína, diuréticos, antihipertensivos, esteroides y metotrexate. Anticoagulantes o trombolíticos, aspirina y otros AINES, ciprofibrato, carbonato de litio, baclofén.

Presentación: estuche de 10 comprimidos recubiertos. E.F. 35.682.

Venta con prescripción facultativa.