

## **Brugesic® 100 mg / 5 mL suspensión pediátrica**

**Descripción:** Brugesic® 100 mg / 5 mL suspensión pediátrica. E.F. 27.455 / 09.

### **USO PEDIÁTRICO**

**Composición:** cada 5 mL contienen: ibuprofeno 100 mg, azúcar 1.500 mg, vehículo c.s.

**Indicaciones:** tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada. Tratamiento de la fiebre.

**Vía de administración:** oral.

**Posología:** niños mayores de 6 meses: 5 a 10 mg/Kg/dosis. Cada 6 a 8 horas.

**Reacciones adversas:** gastrointestinales: náuseas, vómito, epigastralgia, indigestión, diarrea, dolor abdominal. Neurológicas: cefalea, mareos, somnolencia, visión borrosa. Dermatológicas: erupción cutánea, edema. Otras: con dosis altas y durante tiempo prolongado se ha informado casos de trastornos hematológicos, hepatotoxicidad, ulceración y hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y disfunción renal.

**Advertencias:** producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. El paciente debe informar al médico cualquier efecto indeseable, especialmente en caso de trastornos del tracto digestivo.

**Precauciones:** pacientes con insuficiencia hepática y/o renal crónica, antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, asma bronquial.

**Contraindicaciones:** pacientes con hipersensibilidad al ibuprofeno y a otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, sangramiento gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, alteraciones de la coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes, dengue, niños menores de 6 meses.

**Interacciones:** digoxina, fenitoína, diuréticos, antihipertensivos, esteroides y metotrexate. Anticoagulantes o trombolíticos, aspirina y otros AINES, ciprofibrato, carbonato de litio, baclofén.

**Presentación:** frasco de 60 mL con vaso dosificador. E.F. 27.455 / 09.

**Venta con prescripción facultativa.**