

Brugesina® 300 mg / 10 mg comprimidos recubiertos

Descripción: Brugesina® 300 mg / 10 mg comprimidos recubiertos. E.F. 32.413 / 09.

Composición: cada comprimido recubierto contiene: ibuprofeno 300 mg, hyoscina N-butil bromuro 10 mg, excipientes c.s.

Indicaciones: analgésico antiespasmódico.

Vía de administración: oral.

Posología: 1 a 2 comprimidos cada 8 horas.

Reacciones adversas: náuseas, vómito, epigastralgia, diarrea, dolor abdominal, mareos, somnolencia, erupción cutánea, edema, visión borrosa, supresión de la secreción salival y sudorípara, trastornos de la micción, taquicardia, midriasis, vértigo, hipotensión, reacciones de hipersensibilidad, retención urinaria. Se han reportado casos de trastornos hematológicos, hepatotoxicidad, ulceraciones y hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y trastornos renales con la administración a dosis altas y durante tiempo prolongado de ibuprofeno. A dosis elevada, la hyoscina puede producir trastornos de la acomodación.

Advertencias: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.

Precauciones: insuficiencia hepática y renal crónica, pacientes con antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica o hemorragias gastrointestinales, asma bronquial, hipertensión arterial, trastornos auditivos y visuales.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o a otros antiinflamatorios no esteroideos, sangramiento gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, pacientes con alteraciones de la coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes, pacientes con íleo paralítico, obstrucción intestinal mecánica, hipertrofia prostática, glaucoma y miastenia gravis.

Interacciones: anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, preparados potásicos, antagonistas de la dopamina, quinidina, amantadina, disopiramida, betadrenérgicos, alcohol.

Presentación: estuche de 20 comprimidos. E.F. 32.413 / 09.

Venta con prescripción facultativa.