

## **Cefonax® 250 mg / 5 mL suspensión**

**Descripción:** Cefonax® 250 mg / 5 mL suspensión. E.F. 28.393 / 09.

**Composición:** cada 5 mL contienen: monohidrato de cefadroxilo equivalente a 250 mg de cefadroxilo base, azúcar 2,369 mg, excipientes c.s.

**Indicaciones:** tratamiento de las infecciones producidas por microorganismos susceptibles al cefadroxilo.

**Vía de administración:** oral.

**Posología:** adultos: 500 mg a 1 g (1 a 2 veces al día dependiendo de la severidad de la infección). Niños: 25 a 50 mg / Kg / día en 2 dosis.

**Espectro de acción:** el cefadroxilo es activo contra una gran variedad de microorganismos Gram (+) con excepción de enterococcus, stafilococcus resistentes a metilicina, posee actividad contra microorganismos coliformes echerichia coli, klebsiella, ciertas cepas de proteus y enterobacter, haemophilus influenzae.

**Reacciones adversas:** *reacciones de hipersensibilidad:* erupción, urticaria, angioedema. *Gastrointestinales:* náuseas, vómito, diarrea, dispepsias, síntomas de colitis pseudomembranosa. *Otras:* moniliasis vaginal, neutropenia transitoria, elevación de transaminasas. *S.N.C.:* nefrotoxicidad. *Raras:* hematológicas.

**Advertencias:** en pacientes alérgicos a la penicilina, las cefalosporinas deberán utilizarse con suma precaución. Existe evidencia clínica y de laboratorio sobre alergenidad cruzada parcial de las penicilinas y cefalosporinas. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable.

**Precauciones:** en pacientes con insuficiencia renal, pacientes con historia de patología gastrointestinal, particularmente colitis. Se han descrito casos de positividad al test directo de Coombs durante el tratamiento con cefalosporinas.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a cefalosporinas y penicilinas. Embarazo. Lactancia.

**Interacciones:** con neomicina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.

**Presentación:** frasco para preparar 60 mL de suspensión. E.F. 28.393 / 09.

**Venta con prescripción facultativa.**