

Colfene® 400 mg / 4 mg comprimidos recubiertos

Descripción: Colfene® 400 mg / 4 mg comprimidos recubiertos. E.F. 33.110 /11.

Composición: cada comprimido recubierto contiene: ibuprofeno 400 mg, tiocolchicósido 4 mg, excipientes c.s.

Indicaciones: tratamiento de la contractura de la musculatura estriada que cursa con dolor de intensidad leve a moderada.

Vía de administración: oral.

Posología: 1 comprimido cada 8 horas.

Reacciones adversas: erupciones cutáneas, diarrea, epigastralgias.

Advertencias: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia.

Precauciones: pacientes con alteraciones del funcionalismo hepático y renal. Pacientes con alteraciones del tracto gastrointestinal.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Úlcera gastrointestinal. Dengue.

Interacciones: aumento de la acción de los anticoagulantes. Aumento de los niveles plasmáticos de litio y digoxina. Disminuye la actividad de los antihipertensivos. Aumento del riesgo de insuficiencia renal aguda con el uso de diuréticos.

Presentación: estuche de 10 y 20 comprimidos recubiertos. E.F. 33.110 /11.

Venta con prescripción facultativa.