

## **Flatoril® 80 mg / mL suspensión gotas**

**Descripción:** Flatoril® 80 mg / mL suspensión gotas. E.F. 35.935.

**Composición:** cada mL contiene: simeticona 80,00 mg, sucralosa 1,00 mg, excipientes c.s.

**Indicaciones:** alivio temporal y sintomático de los trastornos de la digestión. Antiflatulento.

**Vía de administración:** oral.

**Posología: (dosis recomendada):** *adultos:* 80 - 160 mg (1-2 mL) cada 6 a 8 horas. *Dosis pediátrica: 3 - 6 meses:* 20 mg / dosis (0,25 mL / dosis) cada 8 horas, *dosis máxima:* 60 mg / día (0,75 mL / dosis). *6 - 12 meses:* 20 a 40 mg / dosis (0,25 - 0,50 mL / dosis) cada 8 horas, *dosis máxima:* 120 mg / día (1,50 mL / día). *Niños mayores de 12 meses:* 40 mg / dosis (0,50 mL / dosis) cada 8 horas, *dosis máxima:* 120 mg / día (1,50 mL / día).

**Advertencias:** no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable.

**Precauciones:** en caso de dolor abdominal, náuseas, vómito y/o estreñimiento no se administre este producto.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Estenosis pilórica.

**Presentación:** frasco de 20 mL en estuche de cartón. E.F. 35.935.

**Venta sin prescripción facultativa.**