

FLOMED 0,15% - 0,25% SOLUCIÓN TÓPICA BUCAL ATOMIZADOR
Bencidamina clorhidrato - cloruro de cetilpiridinio

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contienen: bencidamina clorhidrato 1,5 mg, cloruro de cetilpiridinio 2,5 mg, sucralosa 1,0 mg, benzoato de sodio, glicerina, esencia de menta, vehículo c.s.

Cada: 0,14 mL (pulverización): contiene 0,2 mg de Bencidamina clorhidrato y 0,3 mg de cloruro de cetilpiridinio

INDICACIONES: Antiséptico y antiinflamatorio tópico de la mucosa bucofaríngea.

POSOLOGÍA: (Dosis recomendada):

Aplicar la solución sin diluir directamente en las zonas afectadas tres veces al día.

VIA DE ADMINISTRACION: tópico bucal.

MODO DE EMPLEO: Fije sobre la válvula el atomizador y presione hasta abajo hasta que el líquido comience a salir. Introduzca el atomizador en la boca y presione la válvula. Retire el atomizador, trague rápidamente varias veces.

ADVERTENCIAS: si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada.

PRECAUCIONES: No ingerir. Debe evitarse el uso indiscriminado ya que puede ocasionar irritación de la mucosa.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS: Irritación, ardor, prurito en la zona de aplicación.

Consérvese a temperatura inferior a 30°C

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 41.019/15

Farmacéutico Patrocinante: Dra. Arelys Carolina Heras

Venta sin prescripción facultativa.

Elaborado y distribuido por Laboratorios Elmor S.A., Planta: Guacara, Edo. Carabobo,- Venezuela

Oficinas: La Castellana - Caracas Rif: J-00219195-3

Contenido neto: 45 mL

N° de lote

Elaboración

Expiración