

Genurin 200 mg

Comprimidos Recubiertos

COMPOSICIÓN: cada comprimido recubierto contiene: flavoxate clorhidrato 200 mg, lactosa 13 mg, excipientes c.s.

INDICACIONES: antiespasmódico para el tratamiento sintomático de trastornos del tracto urinario: disuria, polaquiuria, cistitis, uretritis, prostatitis, tenesmo, incontinencia, (post-operatorio, instrumentación), vejiga neurogénica espástica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral

POSOLÓGÍA: 1 Comprimido recubierto 3 veces al día.

REACCIONES ADVERSAS: son de poca frecuencia pero pueden presentarse náuseas, vómitos, boca seca, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, cefalea, nerviosismo.

ADVERTENCIAS: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia ni durante la lactancia, a menos que, a criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No debe administrarse en personas con intolerancia a la lactosa o galactosa.

PRECAUCIONES: usarse con precaución en casos de glaucoma. No se use en menores de 12 años

CONTRAINDICACIONES: obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, obstrucción del tracto urinario inferior.

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 24.164 / 16

Venta con Prescripción Facultativa

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S. A. Rif: J-00219195-3

Oficinas: La Castellana – Caracas.

Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela.

