

Mycofentín® 2% crema vaginal

Descripción: Mycofentín® 2% crema vaginal. E.F. 27.536 / 09.

Composición: cada 100 g contienen: nitrato de fenticonazol 2 g, propilenglicol, lanolina, aceite de almendras, alcohol cetílico, glicerol monoestearato, edetato sódico, éster poliglicólico de ácidos grasos, agua c.s.

Indicaciones: tratamiento de la vulvovaginitis por *Cándida albicans* no recidivantes.

Vía de administración: vaginal.

Posología (dosis recomendada): introducir el contenido de un aplicador profundamente en la vagina 1 vez al día por 7 días. Desechar el aplicador después de cada uso.

Reacciones adversas: puede presentarse una reacción eritematosa leve y transitoria.

Advertencias: producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No debe administrarse durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Tampoco debe administrarse durante el período de lactancia. Si la aplicación de este producto produce irritación, suspéndase su uso y consulte al médico.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Presentación: tubo de 40 g y 8 aplicadores incorporados. E.F. 27.536 / 09.

Venta sin prescripción facultativa.