

## **Provicar® 1 g / 10 mL solución oral**

**Descripción:** Provicar® 1 g / 10 mL solución oral. E.F. 25.755 / 11.

**Composición:** cada 10 mL contienen: L-carnitina 1 g, sacarina sódica 5 mg, vehículo c.s.

**Indicaciones:** deficiencia de carnitina de tipo miopática, sistémica o congénita que se puede manifestar con un bajo índice pondo-estatural, debilidad muscular, poco apetito, fatiga, cansancio, desinterés.

**Vía de administración:** oral.

**Posología:** 50 mg / Kg al día administrado en 3 tomas en los casos de pérdida del apetito, bajo índice pondo-estatural, debilidad muscular, desinterés. 100 mg / Kg al día repartidos en 3 tomas en aquellos casos de deficiencia severa de carnitina.

**Reacciones adversas:** en algunos pacientes puede presentarse ardor o molestias epigástricas y diarreas. Se aconseja en estos casos la ingestión del producto con las comidas.

**Precauciones:** pacientes con trastornos convulsivos se le debe administrar bajo vigilancia médica.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad individual a la L-carnitina.

**Presentación:** frasco de 60, 120 y 180 mL con vaso dosificador. E.F. 25.755 / 11.

**Venta sin prescripción facultativa.**