

Saver® 200 mg / 5 mL polvo para suspensión oral

USO PEDIÁTRICO

COMPOSICIÓN: cada 5 mL contienen: azitromicina (bajo la forma de azitromicina dihidrato) 200,00 mg, sacarosa 4.405,24 mg, excipientes c.s.

INDICACIONES: tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la azitromicina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

POSOLÓGÍA: niños menores de 45 Kg de peso: 10 mg / Kg / día. Niños mayores de 45 Kg de peso: 500 mg / día.

REACCIONES ADVERSAS: gastrointestinales: diarrea, náusea y dolor abdominal.

ADVERTENCIAS: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia ni durante la lactancia. Debido a que la azitromicina tiene vida media muy larga (68 horas), en caso de reacciones alérgicas al medicamento, el tratamiento antihistamínico debe ser por un tiempo no menor de seis días.

PRECAUCIONES: insuficiencia hepática. No administrar con alimentos o antiácidos ya que la absorción del medicamento disminuye. Este producto contiene sacarosa, adminístrese con precaución en pacientes con intolerancia a la sacarosa y en pacientes diabéticos.

CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad conocida a la azitromicina y/o a cualquier otro macrólido.

INTERACCIONES: cimetidina, teofilina, warfarina, dogoxina, ergotamina o dihydroergotamina, triazolan, carbamazepina, terfenadina, ciclosporina, fenitoína, fármacos que se metabolizan por el citocromo P450.

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 38.854 / 18.

Venta con prescripción facultativa y récipe archivado.

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S. A. Rif: J-00219195-3

Oficinas: La Castellana, Caracas.

Planta: Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.