

## Tachipirín Forte® 160 mg / 5 mL suspensión oral

**Descripción:** Tachipirín Forte® 160 mg / 5 mL suspensión oral. E.F. 35.671.

### USO PEDIÁTRICO

**Composición:** cada 5 mL contienen: acetaminofén 160 mg, sacarina sódica 10 mg, vehículo c.s.

**Indicaciones:** tratamiento sintomático de la fiebre y del dolor de leve intensidad.

**Vía de administración:** oral.

### Posología (dosis recomendada):

Dosis de 10 mg / Kg / dosis, cada 4-6 horas.

Dosis Máxima: 15 mg / Kg

Niños:

Mayores de 3 meses a 6 meses:	80 mg / dosis:	2,5 mL
Mayores de 6 meses a 1 año:	100 mg / dosis:	3,0 mL
Mayores de 1 año a 2 años:	120 mg / dosis:	3,75 mL
Mayores de 2 años a 4 años:	160 mg / dosis:	5,0 mL
Mayores de 4 años a 6 años:	200 mg / dosis:	6,25 mL
Mayores de 6 años a 9 años:	250 mg-325 mg / dosis:	7,0 mL-10,0 mL
Mayores de 9 años a 12 años:	375 mg-500 mg / dosis:	12,0 mL-15,0 mL

(Vaso dosificador 20,0 mL)

**Reacciones adversas:** erupción, eritema, urticaria, náuseas, sequedad bucal.

**Advertencias:** la administración de este producto en dosis sucesivas o por tiempo prolongado puede ocasionar graves lesiones hepáticas o renales. En niños menores de 6 meses consulte al médico antes de usar este producto.

**Precauciones:** en caso de enfermedad gastrointestinal (gastritis, úlcera gástrica o duodenal). Su administración por cualquier vía debe ser restringida. Si es indispensable su uso debe consultar previamente al médico.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

**Interacciones:** antiinflamatorios no esteroideos.

**Presentación:** frasco de 120 mL. E.F. 35.671.

**Venta sin prescripción facultativa.**