

Talzic® 10 mg / mL solución gotas

Descripción: Talzic® 10 mg / mL solución gotas. E.F. 29.348 / 09.

Composición: cada 1 mL (30 gotas) contienen: cetirizina diclorhidrato 10 mg, sacarina sódica, propilenglicol, vehículo c.s.

Indicaciones: antihistamínico. Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgica perenne, prurito y urticaria alérgica.

Vía de administración: oral.

Posología: *niños de 2 años a 6 años:* 0,1 – 0,3 mg / Kg / día. *Dosis máxima:* 5 mg / día. Niños mayores de 6 años 10 mg / día.

Reacciones adversas: *neurológicos:* mareo, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculógiras, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. *Gastrointestinales:* anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento o diarrea. *Cardiovasculares:* palpitaciones, hipotensión arterial. *Otras:* xerostomía, xarausis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, enuresis.

Advertencias: puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable.

Precauciones: durante su administración, evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos y maquinaria automotriz. La ingesta concomitante de alcohol u otro depresor del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la cetirizina. Niños menores de 2 años. Pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.

Interacciones: teofilina, alcohol etílico, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del sistema nervioso central.

Presentación: frasco de 20 mL. E.F. 29.348 / 09.

Venta con prescripción facultativa.