

Tríttico® 50 mg tabletas

Descripción: Tríttico® 50 mg tabletas. E.F. 22.699 / 09.

Composición: cada tableta contiene: trazodone clorhidrato 50 mg, excipientes c.s.

Indicaciones: antidepresivo. Depresión orgánica, endógena, psicógena, sintomática e involutiva. Estados mixtos de depresión con ansiedad. Depresiones atípicas o enmascaradas.

Vía de administración: oral.

Posología: *inicial:* 150 mg / día en dosis dividida después de las comidas. Aumentar 50 mg / día cada 3 – 4 días, hasta obtener el efecto deseado. *Dosis máxima:* 400 mg / día en pacientes ambulatorios, 600 mg / día en pacientes hospitalizados.

Reacciones adversas: en algunos casos pueden aparecer somnolencia, astenia, hipotensión, cefalea, vértigo, sequedad bucal, trastornos gastrointestinales. Se han reportado casos de priapismo en pacientes sobredosificados.

Precauciones: debe usarse con precaución en pacientes que manejen vehículos o maquinaria pesada. Se recomienda evaluación del funcionalismo hepático y control hemático durante el tratamiento.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la droga, embarazo y lactancia.

Presentación: estuche de 30 tabletas. E.F. 22.699 / 09.

Venta con prescripción facultativa.