

## **Ulcenol® tabletas**

famotidina

### **COMPOSICIÓN:**

- Ulcenol 40 mg tabletas: cada tableta contiene: famotidina 40 mg, excipientes c.s.
- Ulcenol 20 mg tabletas: cada tableta contiene: famotidina 20 mg, excipientes c.s.

### **INDICACIONES:**

Gastritis, esofagitis, úlcera gástrica benigna, úlcera duodenal, síndrome hipersecretor tipo Zollinger – Ellison, para reducir la recidiva de úlcera duodenal.

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

### **POSOLOGÍA:**

- Ulcenol 40 mg tabletas: gastritis, esofagitis, duodenitis: 1 tableta antes de acostarse durante 2 a 4 semanas. Síndrome ulcero-péptico: 40 mg antes de acostarse durante 4 a 8 semanas hasta cicatrización de la úlcera. Síndrome Zollinger – Ellison: 40 mg cada 6 horas de inicio, la dosis se ajusta de acuerdo a las necesidades del paciente.
- Ulcenol 20 mg tabletas: gastritis, esofagitis, duodenitis: 1 tableta 2 veces al día durante 2 a 4 semanas. Síndrome ulcero-péptico: 40 mg antes de acostarse durante 4 a 8 semanas hasta cicatrización de la úlcera. Síndrome Zollinger – Ellison: 40 mg cada 6 horas de inicio, la dosis se ajusta de acuerdo a las necesidades del paciente.

### **REACCIONES ADVERSAS:**

Estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, astenia y cefalea, también se ha descrito aumento de las transaminasas séricas, leucopenia, y disminución de las plaquetas, alteraciones de carácter reversible al suspender el tratamiento.

### **ADVERTENCIAS:**

Durante el tratamiento debe evaluarse la tensión intraocular en pacientes con historia de glaucoma, ya que se ha descrito exacerbación de casos de glaucoma tras la administración de este tipo de producto (bloqueantes H2). La respuesta de los síntomas de úlcera gástrica al tratamiento con agentes bloqueantes H2 no excluye la presencia de una lesión gástrica

maligna, por lo tanto, antes de iniciar el tratamiento con este producto debe estudiarse dicha posibilidad diagnóstica.

**PRECAUCIONES:**

Debe ser administrado con precaución en pacientes con daño hepático. En los casos de insuficiencia renal debe ser ajustada la dosis recomendada.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, embarazo, lactancia, insuficiencia hepática o renal severa.

**INTERACCIONES:**

Ketoconazol, itraconazol, cefalosporinas.

**Registrado en el M.P.P.S. bajo el N°**

- Ulcenol 40 mg tabletas E.F. 25.348 / 17.
- Ulcenol 20 mg tabletas E.F. 25.349 / 17.

Venta con prescripción facultativa.

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S. A. Rif: J-00219195-3

Oficinas: La Castellana – Caracas.

Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela.