

Zitoxil® 2% solución

Descripción: Zitoxil® 2% solución. E.F. 24.594 / 09.

Composición: cada mL contiene: minoxidil 0,02 g, alcohol 95° 0,7 mL, propilenglicol 0,1 mL, agua c.s.

Indicaciones: alopecia androgénica. Su uso se limita a pacientes con calvicie circunscrita de poca evolución, el efecto de nuevo crecimiento del cabello se logra después de 3 – 4 meses de aplicación continua.

Vía de administración: tópica.

Posología: 1 mL en la mañana y 1 mL en la noche. No exceder de 40 mg / mL.

Reacciones adversas: ocasionalmente puede presentarse irritación local, dermatitis, descamación, eritema, prurito, hipertrichosis en zonas diferentes al sitio de aplicación, erupción.

Precauciones: debe tomarse en cuenta que puede ser absorbido a través de la piel, ocasionando efectos sistémicos tipo taquicardia, retención de sodio y agua, disminución de la presión arterial previa, potenciación de efectos de beta bloqueantes, alteración E.C.G. Se debe realizar controles E.C.G. antes, durante y después del tratamiento para detectar cualquier alteración.

Contraindicaciones: pacientes con hipersensibilidad al minoxidil, pacientes menores de 18 años, embarazo, lactancia.

Presentación: frasco de 100 mL (solución al 2%) con gotero dosificador. E.F. 24.594 / 09.

Venta sin prescripción facultativa.