

## **Zitoxil® 3% solución**

**Descripción:** Zitoxil® 3% solución. E.F. 24.576 / 09.

**Composición:** cada mL contiene: minoxidil 0,03 g, alcohol 95° 0,7 mL, propilenglicol 0,1 mL, agua c.s.

**Indicaciones:** alopecia androgénica. Su uso se limita a pacientes con calvicie circunscrita de poca evolución, el efecto de nuevo crecimiento del cabello se logra después de 3 – 4 meses de aplicación continua.

**Vía de administración:** tópica.

**Posología:** 1 mL diario. No exceder de 40 mg / mL.

**Reacciones adversas:** ocasionalmente puede presentarse irritación local, dermatitis, descamación, eritema, prurito, hipertrichosis en zonas diferentes al sitio de aplicación, erupción.

**Precauciones:** debe tomarse en cuenta que puede ser absorbido a través de la piel, ocasionando efectos sistémicos tipo taquicardia, retención de sodio y agua, disminución de la presión arterial previa, potenciación de efectos de beta bloqueantes, alteración E.C.G. Se debe realizar controles E.C.G. antes, durante y después del tratamiento para detectar cualquier alteración.

**Contraindicaciones:** pacientes con hipersensibilidad al minoxidil, pacientes menores de 18 años, embarazo, lactancia.

**Presentación:** frasco de 30 mL (solución al 3%), con gotero dosificador. E.F. 24.576 / 09.

**Venta sin prescripción facultativa.**